


Ficha Técnica – Pharma-Algi F

Registro ANVISA: MS 81606090044 Marca / Modelo fabricante: Pharma-Algi F

Fabricante: Pharmaplast

Representação gráfica




Descrição

Pharma-Algi F é uma compressa primária hemostática, feita de fibras absorventes não tecidas 100% alginato de cálcio derivadas de algas marinhas. Possui capacidade de absorver 14 vezes seu peso em exsudato, o prendendo no interior do curativo, evitando a maceração e formando um gel. O gel formado mantém um microambiente ideal que promove a cicatrização e a formação de tecido de granulação. Não adere aos tecidos recém-formados e permite a remoção como peça única.

Como funciona?

O alginato de cálcio utilizado neste produto gelifica rapidamente ao efetuar troca com o sódio no sangue e forma um microambiente fisiologicamente úmido que favorece a cicatrização e a formação de tecido de granulação. Os íons de cálcio que são doados à ferida são essenciais para o processo de coagulação, assegurando a interrupção da hemorragia.



Apresentação comercial

Pharma-Algi F é embalado individualmente em envelope de papel grau cirúrgico e possui os seguintes modelos comerciais:

Códigos	Dimensões	Códigos	Dimensões
Pad Algi F Ag 5050	5 X 5 cm	Pad Algi F Ag 1015	10 X 15 cm
Pad Algi F Ag 5075	5 X 7.5 cm	Pad Algi F Ag 1020	10 X 20 cm
Pad Algi F Ag 50100	5 X 10 cm	Pad Algi F Ag 230 cavity	2 X 30 cm
Pad Algi F Ag 1010	10 X 10 cm	Pad Algi F Ag 240 cavity	2 X 40 cm

Indicações

Pharma-Algi F é indicado como curativo primário para tratar feridas de espessura total e parcial, com exsudatos moderados a altos e propensas a pequenas hemorragias como: lesões por pressão, úlceras na perna (venosas e arteriais), úlceras diabéticas e isquêmicas, feridas pós-operatórias, feridas traumáticas, feridas cavitárias, locais doadores e receptores de enxerto, carcinomas fúngicos, queimaduras superficiais e de espessura parcial.

Contraindicações

Pharma-Algi F é contraindicado em pessoas com alergia conhecida aos alginatos, para feridas tecidos secos ou necróticos. Não deve ser utilizado como esponja cirúrgica ou para hemostasia em feridas com elevado sangramento.



Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte

- a) **Precauções:** O Pharma-Algi F pode aderir se utilizado em feridas com pouco exsudato, caso não for facilmente removido, umedecer com solução fisiológica e, em seguida, remover. Quando utilizado em feridas infectadas, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo interno.
- b) Restrições: Não se aplica.
- c) Advertências: Uso Único Descartar após o Uso Produto Estéril.
- d) **Cuidados especiais e esclarecimentos:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Se o curativo não sair facilmente, umedecer com soro e retirar.
- e) **Armazenamento:** O produto deve ser mantido em temperatura ambiente (0 a 25°C), em local seco, fresco e ao abrigo da luz.
- f) **Transporte:** O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

Instruções de utilização

- 1. Realizar a limpeza da ferida conforme protocolo interno.
- 2. Abrir a embalagem do Pharma-Algi F.
- 3. Aplicar o curativo no local desejado. Pode ser cortado conforme desejado.
- 4. Fixar o Pharma-Algi F sobre a pele com a ajuda de um curativo secundário. Em feridas muito exsudativas fazer uso de curativo secundário absorvente. O curativo secundário não é fornecido junto ao produto.







Segurança e Eficácia

Pharma-Algi F é esterilizado por óxido de etileno.

O teste de Bioburden é realizado rotineiramente pelo fabricante para monitoramento nas amostras dos produtos de acordo com a norma ISO 11737-1, antes e após o processo de esterilização.

Os resultados do teste de biocompatibilidade de acordo com os requisitos definidos na ISO 10993-10:2010 e ISO 10993-5:2010, demostraram conformidade de acordo com as especificações, não demonstrando indicação de liberação de concentrações citotóxicas da substância, irritações ou sensibilidade da pele ou ferida.

Análise e avaliação de risco realizada de acordo com a norma EN ISO 14971:2012, não evidenciou nenhum risco específico relacionado ao uso do produto.

Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor. Armazenar em local seco a temperatura ambiente Evite qualquer choque térmico.

Validade

Prazo de validade de 3 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

Fabricante: Pharmaplast S.A.E. Amria Free Zone № 23512, Alexandria,

Egypt, Zipcode: 37.23512

Importador: Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda ME Avenida Barão Homem de Melo 4500 Salas 1122/1123 – Estoril – Belo Horizonte/MG | CEP: 30494-270 | Tel: (31) 2531-0619 comercial@goldmedimport.com.br | CNPJ: 28.215.470/0001-91

Responsável Técnica: Teresinha Póvoa – CRF-MG: 5120